



**WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN
I NASIENICTWA W BYDGOSZCZY**

KOMUNIKAT O ZWALCZANIU CHOWACZA PODOBNIKA

S - 24

Roślina: rzepak ozimy
Agrofag: chowacz podobnik

Data rozpoczęcia zabiegów w powiecie: Rypin	
Szczegóły:	Na plantacjach rzepaku stwierdzono występowanie chrząszczy chowacza podobnika.
Zalecenia:	Zabieg chemiczny wykonać w okresie opadania płatków kwiatowych i po wykształceniu się pierwszych łuszczyń. Zabieg wykonywać po zakończeniu lotu pszczoł. W przypadku masowego występowania szkodnika zabieg powtórzyć po 7-10 dniach. Próg szkodliwości dla chowacza podobnika to stwierdzenie przed kwitnieniem 1 chrząszcza na 1 roślinę, a podczas kwitnienia, w rejonie słabego występowania pryszczarka kapustnika 1 chrząszcza na roślinę, natomiast w rejonie silnego występowania pryszczarka kapustnika – 1 chrząszcza na 2 rośliny.
Środki ochrony roślin:	Szczegółowe informacje o środkach ochrony roślin dopuszczonych do stosowania w Polsce są dostępne pod adresem: http://www.minrol.gov.pl/ >Informacje branżowe>Produkcja roślinna>Ochrona roślin
Uwagi:	Długotrwałe stosowanie środków z tej samej grupy chemicznej prowadzi do wykształcenia u agrofaga odporności na daną substancję aktywną. Zaleca się, więc rotację w stosowaniu środków z różnych grup chemicznych. Podstawą prawidłowego wykonania zabiegu jest etykieta – instrukcja stosowania środka. Należy dokładnie zapoznać się z jej treścią. Posiadacze gruntów, na których są prowadzone zabiegi ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia ewidencji zabiegów i przechowywania jej przez okres, co najmniej 2 lat od wykonania zabiegu. [art.71 pkt.1,2 i 3 Ustawy z dnia 18 grudnia 2003. o ochronie roślin (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 849 z późn. zm.)]

Rypin, dnia 05.05.2009

Kierownik Oddziału: Jan Nowiński